

Lettre d'information du mois de mars.

Dans nos jardins...

par Robert

Taille tôt, taille tard, taille en Mars :

Nous allons faire le tour de la grande famille des rosiers.

Quand les tailler ?

Arbustes- buissons- miniatures : début mars

Grimpants remontants : début mars

Grimpants non remontants : après la floraison

Rosiers liane = taille inutile

Le mot remontant signifie que ce genre de rosier fleurit plusieurs fois dans la saison.

Ils fleurissent par vagues en général en juin et en septembre

Ceux qui sont non remontants, fleurissent énormément de mai à fin juillet.

Pour tous ces rosiers, évitez de les mettre en pleine chaleur et contre un mur blanc.

Il est conseillé de mettre un treillage bois ou plastique, pour fixer les branches et éviter qu'elles ne se croisent.



Les rosiers lianes : on peut les faire grimper sur un arbre mort laissé en place mais il faut prendre la précaution de faire le trou de plantation à 50 cm du pied de l'arbre.

Ces rosiers ont une telle vigueur qu'ils vont s'entourer autour de l'arbre sans avoir besoin d'aucune taille. Il faut posséder de l'espace pour avoir une décoration.




Les rosiers couvre sol : ils tapissent le sol, empêchent l'herbe de pousser, conviennent très bien pour mettre en valeur certains coins et autour d'un arbre en forme de cône genre fusain.

Leur entretien est très réduit, un coup de cisaille pour les remettre à la forme souhaitée. Ils restent en fleurs tout l'été et ne craignent aucune maladie.



Les rosiers buisson remontants :



Il m'est un peu difficile d'expliquer par dessin.

Nous ferons pendant le mois de mars deux ateliers sur le sujet.

A l'automne, on peut réduire le rosier d'un tiers de sa longueur, le traiter aux huiles blanches d'hiver et lui faire une protection de paille sur le pourtour. A partir de fin février, commencer de réduire la paille et la remplacer par du fumier de bovin de préférence. Il va grandir (attention qu'il le fasse harmonieusement) et ne manquez pas de le diriger selon vos désirs.

Pour faire refleurir votre rosier, couper les roses fanées au-dessus de l'œil en descendant le long de la tige (sur un œil vers l'extérieur).



La bonne coupe est sur la photo de gauche.

Nous reviendrons sur la taille directement sur le terrain.

Faire attention aux différentes maladies ou très souvent aux pucerons.

Plantez de l'ail au pied des rosiers pour les protéger ou de la menthe.

Si vous voyez des fourmis sur vos rosiers, pulvériser un purin de fougère. Ce sont les fourmis qui transportent les pucerons pour récupérer le miellat, ce miellat correspond aux déjections des pucerons.



Ces taches que l'on voit, c'est la maladie du marsonia, maladie cryptogamique due à une humidité excessive. Ces feuilles ne tarderont pas à jaunir et à tomber, la perte des feuilles peut être totale.

Faire une décoction de prêle, diluée à 20 %, prendre 2 litres de prêle diluée, ajouter une cuillère à soupe de fleur de soufre. Traiter le soir par temps doux.

Décoction de prêle : voir article du 09/2014.

La pomme de terre, quelle variété choisir parmi les 200 variétés sur le marché?

Les variétés:

Parmi les personnes de l'association, il ne me semble pas qu'il y ait des très grands jardins, pour pouvoir cultiver les pommes de terre en plusieurs variétés. Pour ma part, je cultive quinze pieds de pommes de terre hâtives et cinquante pieds de précoces mais en tenant compte de certains critères.

Il y a certaines variétés appelées pommes de terre primeurs, genre "monottes" ou "Noir Moutiers" mais ces dernières sont cultivées sous serres tempérées.

Les variétés précoces : Belle de Fontenay, Amandine, Rosabelle. Elles doivent être plantées sous serre froide ou en pleine terre au jardin avec un voile d'hivernage, étendu sur le dessus (mais pas tendu) et enterré de part et d'autre de la parcelle. De cette manière le voile montera en même temps que les plants de pommes de terre.

Ces variétés poussent relativement vite entre 75 et 90 jours. Ce sont des pommes de terre à chair ferme, très bien pour faire sauter ou frites ou de différentes façons. Le temps de conservation est assez restreint 80 jours.

Les variétés un peu moins précoces : Chérie à peau rose, Bernadette, Monalisa, Bintch. Je cite des variétés déjà plantées dans mon jardin pour être sûr de mes conseils. Ma préférée (chérie à peau rose), pomme de terre ovale à chair ferme, facile à éplucher et qui convient bien pour les gratins et tout autre besoin. Attention sa conservation est courte.

Les variétés tardives : Pommes de terre souvent farineuses, très bien pour les soupes et les purées. Les catégories : kerpondy, Roseval, bleu d'Auvergne. La variété Kerpondy donne une très grosse production et a une très bonne conservation mais est très longue à pousser 130 à 150 jours.

La culture:

En règle générale, dans la région, on les plante au plus tôt le 15 mars. Le terrain doit être bien préparé en profondeur, une bonne fumure est de rigueur. Si vous avez des cendres de bois, en mettre trois bonnes poignées au m².

Placez votre cordeau de part et d'autre de la parcelle, tracez un sillon de 15 cm de profondeur et placez une pomme de terre tous les 30 cm. Ramenez délicatement la terre avec le râteau et tasser sur le dessus avec le dos du râteau.

Les rangs doivent être écartés de 40 à 50 cm pour pouvoir butter les plants quand ils auront poussé de 10 cm. Butter signifie rapprocher la terre de part et d'autre du plant pour permettre aux racines de bien se développer.



Belle de Fonteney



Chérie peau rose

L'arrosage : Les pommes de terre que je plante dans la serre froide sont arrosées en fonction de la chaleur et celles plantées en pleine terre le sont après le buttage. Ensuite, je paille entre les rangs et je traite deux fois à la bouillie bordelaise contre le mildiou. Photo ci-dessous.



Si quelques feuilles présentent des signes de mildiou, il faut immédiatement les couper et les détruire. Préparer une pulvérisation de bouillie Bordelaise et traiter rapidement. Refaire le traitement en cas de pluie et bien insister sous le revers des feuilles.

Le Doryphore (redoutable guerrier).

C'est le pire ennemi des pommes de terre et solanacées, il a été découvert en Amérique vers 1824. Ensuite, il est arrivé en Europe par transport maritimes vers 1921.

L'insecte, dont la larve et l'imagos ont le même régime alimentaire, se nourrit des solanacées (pommes de terre, tomates, aubergines en particulier, parfois même la carotte et le persil).

Son mode de vie : Le doryphore adulte vit entre un et deux ans, les femelles pondent des centaines d'œufs au revers des feuilles, l'éclosion durera entre quatre et dix jours en fonction de la météo. Les larves naissantes sont tout de suite dévoratrices des feuilles de pommes de terre ou autres solanacées. La femelle peut pondre 800 œufs pendant sa vie.



Les œufs



Les larves au travail

Ensuite, elles s'enfouissent quinze jours sous terre entre 4 et 20 centimètres de profondeur pour se nymphoser. Ils passent l'hiver sous terre et sortent aux premiers beaux jours et le cycle recommence. Ils ont des ailes et peuvent se déplacer de jardins



en jardins.

Gros plan sur la larve:

A ce stade, on peut encore les détruire par pulvérisation de *Bacillus Turiengiensis*, Le ramassage manuel reste le plus efficace. Il faut surveiller de très près et prélever les feuilles chargées d'œufs et surtout les détruire hors du jardin.

Il y a quarante ans que je fais du jardin à Vourey, je n'ai jamais eu un seul doryphore pourquoi je ne sais pas.

De vous à nous...

Partageons nos savoirs, bons plans, recettes...

Recettes :

Recette proposée par Karima.

Tarte épinard et pignons (de Cyril Lignac)

500g de pousses d'épinard. 20cl de crème fraîche. 3 œufs. 1 boule de mozzarella.
300g de pâte feuilletée ou brisée. 50g de pignons. 1 càs d'huile d'olive. Sel et poivre.

Étaler la pâte et en foncer un moule à tarte. Couper l'excédent si besoin. Piquer le fond et réserver au frais.

Préchauffer le four à 210°C (th7).

Dans un bol, fouetter les œufs avec la crème, saler et poivrer.

Couper la mozzarella en lamelles.

Étaler les épinards sur le fond de tarte. Verser l'appareil aux œufs par-dessus, répartir de mozzarella et parsemer de pignons.

Avec le restant de pâte, faire des croisillons sur la tarte. Enfournier 30 minutes et servir chaud ou tiède.

Pêle-mêle :

Atelier réalisé chez Sylvie le 16/02/18 : Construction d'un châssis.

Châssis réalisé à partir d'un cadre de fenêtre double vitrage.

Matériel :

3 planches en sapin de 27mm d'épaisseur, de 20 cm de largeur et de 1,25 mètre de long.

3 planches de même épaisseur et largeur que précédemment mais de 0,57 mètre de long => 2 seront pour les côtés et l'autre sera coupée en diagonale pour les parties supérieures.

Prendre 1 liteau de 2 mètres et couper 2 morceaux de 18 cm pour fixer sur l'unique planche avant

Prendre 1 liteau de 2 mètres section carré 40x40 mm et couper ce liteau à 1 mètre juste, il sera fixé sur la partie haute pour renforcer la planche où viendra se fixer les paumelles d'ouverture


Acheter 40 vis 4/45 à tête cruciforme

3 paumelles de longueur 100 mm

1 poignée fixe à mettre sur le dessus

1 tube de colle à bois pour partie humide

Pour un meilleur travail, toutes les parties jointives seront collées entre elles.





Programme

Date	Heure	Lieu	Thème	Intervenant
Mars 2018				
3 mars	14h00	Coublevie	Taille des rosiers chez Denise. Reporter au mercredi 7 mars si intempéries)	
17 mars	14h00	Montaud Ferme de l'Espinasse	Atelier sur l'électro culture	Brigitte Merandao
Avril 2018				
7 et 8 avril	14h00	Réaumont	Thème : La permaculture	
21 avril	14h00	A définir	Analyse de terre de nos jardins + observation des bourgeons	

Contacts :

Jardin Naturel, Astuces & Conseils (JNAC)

185, route de Cerveloup, 38210 VOUREY

Renseignements sur les fruitiers :

rosset.claude@free.fr

Renseignements sur le jardin naturel:

famille.lions@wanadoo.fr

Site internet :

jnac.e-monsite.com